

京都私立病院協会嚥下食一覧表

施設名	共和病院
-----	------

学会分類 2013(※)	食事の名称	形態	食事の特徴	写真
0j	嚥下開始食	ゼリー	タンパク質を含まない糖質メインの市販のゼリーを1日1食から提供	
0t	(設定なし)			
1j	嚥下1 嚥下2(a・b)	ムース状 ミキサーにかけ スベラカーゼ1～ 1.5%で固めたもの	嚥下1・・・全粥ゼリー、汁ゼリー、市販ゼリー3品 嚥下2・・・軟々菜食をミキサーにかけゼリーに固めたもの。お茶ゼリーを食事時に提供 主食スベラカーゼ2%、副食スベラカーゼ1～1.5% カロリーの違い(量)によりa・bと区分	
2-1	嚥下3 嚥下4	主食 粥ゼリー 副菜 ミキサーとろみ	嚥下3・・・主食全粥ゼリースベラカーゼ2%、副食ミキサーとろみスルーキングi1～1.5% 嚥下4・・・主食全粥ゼリースベラカーゼ0.7%、副食ミキサーとろみスルーキングi1～1.5% 状況に応じてお茶とろみも提供	
2-2	(設定なし)			
3	(設定なし)			
4	嚥下5	主食は全粥または軟飯 副菜はきざみ(0.5mm) とろみ	主食は全粥を基本とし軟飯も可能 副菜は刻んで(0.5mm)スルーキングi1～1.5%でとろみをつけたもの	